

Vite


Cocciniglie



Acariosi




Erinosi



Oidio



Oidio (effetto collaterale)



Stadio d'applicazione



POLITHIOL®

POLITHIOL® è un olio minerale paraffinico per impiego al bruno che, per la sua innovativa formulazione in suspo-emulsione con coadiuvanti specifici e contenente zolfo, esplica la sua azione su un ampio spettro di acari, insetti e funghi patogeni.

COMPOSIZIONE	Olio minerale paraffinico 41,3% (400 g/L) (N. CAS 97862-82-3)
FORMULAZIONE	Liquido emulsionabile
INTERVALLO DI SICUREZZA	Non previsto.
N° DI REGISTRAZIONE	11760 del 01.03.2006
CONFEZIONE	L 20 - 600
INDICAZIONI DI PERICOLO	ATTENZIONE H317 - H319 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/hL)	DOSE (L/ha)
Pomacee	Cocciniglia grigia e altre Cocciniglie, Acari, Eriofidi, Psilla del pero, Afide lanigero	5	50 - 75
Drupacee	Cocciniglia grigia, Cocciniglia bianca, Acari, Eriofidi	5	50 - 75
Noce, Nocciolo, Castagno	Cocciniglie, Eriofide, Acari	5	50
Vite	Cocciniglie, Eriofidi, Acari, Scafoideo (<i>Scaphoideus titanus</i>)	5	10 - 40
Kiwi	Cocciniglia bianca	5	50
Kaki, Melograno, Fico	Cocciniglie	5	50

Sul nocciolo trattare entro la 3° foglia. Sul kaki non applicare il prodotto oltre la fase di gemma ferma. Su tutte le altre colture, effettuare gli interventi sempre durante il riposo vegetativo ("al bruno") e comunque mai oltre la fase di "gemma ingrossata" sui fruttiferi o di "gemma cotonosa" su vite.

@ - Maggiori dettagli a pag.9



UPL ITALIA s.r.l.
Via Terni, 275
47522 S. Carlo di CESENA (FC)
tel. +39 0547 66 15 23
upl-ita.com/it

UPL Italia



POLITHIOL®

Chi ben comincia...



- Impiegabile al bruno
- Ampio spettro d'azione
- Adatto per colture arboree
- Utilizzabile in agricoltura biologica

Maggiori informazioni



Pomacee



Afide lanigero



Cocciniglia grigia




Eriofidi




Melo

Afide lanigero
Volume d'acqua: 1500 L/ha
Data trattamento: 14/03
Rilievi:
16/04 (colonie svernanti/branca)
15/05 (nuove colonie/branca)



Pero

Psilla
Volume d'acqua: 1000 L/ha
Data trattamento: 28/02



Stadio d'applicazione



Melo

Pero

*Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

Drupacee



Eriofide




Cocciniglie




Pesco

Cocciniglia Bianca
Volume d'acqua: 1500 L/ha
Data trattamento: 25/11
Rilievo: 03/04



Susino

Eriofide
Data trattamento: 27/02
Rilievo: 05/01
(dieci mesi dopo l'applicazione)



Stadio d'applicazione



Pesco

Susino

*Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

Nocciolo & Kiwi



Nocciolo


Eriofide



Cocciniglie



Stadio d'applicazione




Kiwi

Eriofide



Stadio d'applicazione



*Prove effettuate da centri di saggio autorizzati