

# POLITHIOL®



**POLITHIOL®** è un olio minerale paraffinico per impiego al bruno che, per la sua innovativa formulazione in sospensione emulsionata con coadiuvanti specifici e contenente zolfo, esplica la sua azione su un ampio spettro di acari, insetti e funghi patogeni.

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/hL)	DOSE (L/ha)
<b>Pomacee</b>	Cocciniglia grigia e altre Cocciniglie, Acari, Eriofidi, Psilla del pero, Afide lanigero	5	50 - 75
<b>Drupacee</b>	Cocciniglia grigia, Cocciniglia bianca, Acari, Eriofidi	5	50 - 75
<b>Noce, Nocciolo, Castagno</b>	Cocciniglie, Eriofide, Acari	5	50
<b>Vite</b>	Cocciniglie, Eriofidi, Acari, Scafoideo ( <i>Scaphoideus titanus</i> )	5	10 - 40
<b>Kiwi</b>	Cocciniglia bianca	5	50
<b>Kaki, Melograno, Fico</b>	Cocciniglie	5	50

Sul nocciolo trattare entro la 3° foglia. Sul kaki non applicare il prodotto oltre la fase di gemma ferma. Su tutte le altre colture, effettuare gli interventi sempre durante il riposo vegetativo ("al bruno") e comunque mai oltre la fase di "gemma ingrossata" sui fruttiferi o di "gemma cotonosa" su vite.

@ - Maggiori dettagli a pag.9



**POLITHIOL®** si impiega esclusivamente per trattamenti al bruno: da caduta foglie a "gemma cotonosa".



UPL ITALIA s.r.l.  
Via Terni, 275  
47522 S. Carlo di CESENA (FC)  
tel. +39 0547 66 15 23  
upl-ltd.com/it




upl-ltd.com/it



# POLITHIOL®



Chi ben comincia...




## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Insetticida ed acaricida a base di olio minerale paraffinico impiegabile al bruno

Composizione: Olio minerale paraffinico 41,3% (400 g/L)

Formulazione: Liquido emulsionabile


- Impiegabile al bruno
- Ampio spettro d'azione
- Adatto per colture arboree
- Utilizzabile in agricoltura biologica



## ACARI TETRANICHIDI "Ragnetti" (*Panonychus ulmi*)

Dati medi di 2 prove

Epoca di trattamento: gemma cotonosa



Ragnetto rosso




Ragnetto giallo

Prova effettuata da centro di saggio autorizzato

## COCCINIGLIE COTONOSE

(*Planococcus ficus*, *Heliococcus bohemicus*, *Pulvinaria vitis*)

Dati medi di 2 prove




Epoca di trattamento: gemma cotonosa



## ERINOSI


(*Colomerus vitis*)



Epoca di trattamento: gemma cotonosa (Polithiol®) 3 foglie (Reference)



## EFFETTO COLLATERALE SU OIDIO



Epoca di trattamento: gemma cotonosa (Polithiol®) 3 - 4 foglie (Reference)



Prove effettuate da centri di saggio autorizzati